



小兒用

SIB-004
內衛藥製字第01073號

喘靜[®]
栓劑

Children's
Sentin[®]
Suppositories

3.93cm

藥物之使用大部份以口服及注射為主，但此二種方法有時對小兒頗不方便。本公司鑒於此而採用栓劑來代替口服與注射。經由肛門深部插入直腸之栓劑，其藥物之吸收率並不亞於注射，其副作用亦少，所以對味道不佳或胃腸障害之藥品均能克服其弊端，而且可減少因注射所發生之痛苦，實為一良好之製劑。同時在使用上栓劑不似內服劑需要考慮到飯前、飯後之問題，在任何時間內均可使用並能避免口服困難之情形，因此本公司乃利用上述特點製成本藥。

本藥係採用具有安定性而對支氣管平滑肌有弛緩作用，且可於體內完全被吸收的Diprophylline為主劑，配以水溶性基劑促進主成分在直腸內被吸收。

【成分】每粒中含：

Diprophylline.....200mg

【賦形劑】

Benzethonium Chloride、Witepsol、Cochineal Red A、Propylene Glycol。

【特徵】

1. Diprophylline有緩解支氣管平滑肌痙攣之作用。
2. 本藥之主成分毒性為在Theophylline系藥物中最低，副作用比之更少，如食慾不振、嘔氣、嘔吐等胃腸障害症狀、心悸亢進、頭重、頭痛等之產生極為輕微。
3. 本藥為一安定性化合物，於體內可完全被吸收，效力安定，且不產生習慣性。
4. 本藥係使用水溶性基劑，更能使主成分之易被吸收。
5. 本藥由臨床實驗證明可抑制氣喘發作時之呼吸困難。
6. 在小兒氣喘發作期間口服藥物頗多困難，如投以本藥可收預期之效果，使氣喘之發作迅速消除。

【適應症】

氣喘及支氣管痙攣。

【用法·用量】

通常小兒一次1~2粒，一日2~3次插入肛門深部直腸內。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- (一) 對本藥曾有過敏病歷之患者禁忌使用本藥。
- (二) 下列患者須慎重投與：
 1. 急性心肌梗塞，重症心肌障礙之患者（因有心肌刺激的作用）。
 2. 癩癩、甲狀腺機能亢進症、急性腎炎之患者（副作用容易出現）。
 3. 小兒（容易出現副作用）。
- (三) 副作用：
 1. 精神、神經系：偶有頭痛、不眠等現象出現。
 2. 循環系：偶有心悸亢進出現。
 3. 消化系：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、下痢、腹痛等現象出現。
 4. 投與部位偶有便意、局部不快感、搔癢症等現象出現。
 5. 過敏症：若發生時宜中止投與。
- (四) 小兒之投與，宜小心注意不要過量投與。
- (五) 相互作用：
 1. 與其它的Xanthine系藥劑或中樞神經興奮藥併用時，可能出現過度的中樞神經刺激作用，故宜避免併用，若不得不投與時宜減量並慎重投與之。
 2. 使用本藥品併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。
- (六) 本藥勿吞服，沾水後插入直腸內。
- (七) 室溫保存。



【保存上之注意】

1. 為保持本栓劑之品質，請放置於陰涼或避免日光直射之處。
2. 為避免小孩隨意取用，請放置於小孩不易取得之處。
3. 請在有效期限內使用。

【注意】

本栓劑之配製，旨在於體溫溶化後，即呈現效果。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化，變形等現象。尤其在夏天更易產生溶化之現象，然栓劑之效果，絕不致發生變化。如產生軟化，而致使用困難時，請按下記方法，俟凝固後，再行使用。

1. 栓劑之形體變形時，照原塑膠包裝形態，浸入於溫水（約40~50℃）中，軟化後再按右圖，浸於冷水（20℃以下）即可凝固。
2. 栓劑如軟化或溶化時，請按右圖，浸於冷水（20℃以下）即可凝固。



【包裝】

4~100粒塑膠殼塑膠瓶裝、塑膠殼鐵罐裝、塑膠殼紙盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2141892