

130.00 mm

150.00 mm

葡萄口味

綜合感冒劑  
“晟德” 息咳寧糖漿

Secorine Syrup "Center"

衛署藥製字第 040833 號

主成份：每毫升(ml)含有  
dl-Methylephedrine Hydrochloride.....1.0 mg  
Chlorpheniramine Maleate.....0.1 mg  
Glyceryl Guaiacolate.....5.0 mg

適應症：  
緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰)

用法用量：醫師藥師藥劑生指示藥品  
一日3次。成人每次20毫升，  
12歲以上，適用成人劑量；  
9歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2 (10毫升)；  
6歲以上未滿9歲，適用成人劑量之1/3 (6.7毫升)；  
未滿6歲之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。

藥理作用：  
1. dl-Methylephedrine Hydrochloride：(甲基鹽酸麻黃鹼)對氣管炎及支氣管炎有止咳解痙等支氣管擴張作用，亦能緩解充血性支氣管炎。  
2. Chlorpheniramine Maleate：(縮蘋酸氯菲安明)為具抗過敏作用之抗組織胺劑。  
3. Glyceryl Guaiacolate：(甘油基愈癆木酚)是祛痰劑，可使呼吸道濃稠的黏液減低表面張力，吸收水分，潤濕氣管，去除黏膜刺激，使濃痰變稀薄而易於咳出。

注意事項：  
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。  
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。  
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，請注意下列事項：(1)孕婦及授乳婦不建議自行使用。(2)服用本藥時不得併服其他藥品。  
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。  
5. 使用前須振搖均勻，並使用所附量器量取藥量。  
6. 不得併服含酒精之飲料。

警語：  
1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊等症狀時，應停藥立即就醫。

- 2.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
- (1)6歲以下不建議自行使用。
  - (2)曾經因本藥引起過敏症狀者不得使用。
- 3.患有肝、腎疾病或其他重大疾病之患者，服用本藥前，應先請教醫師藥師藥劑生。
- 4.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥及解熱鎮痛等藥物。
- 5.若咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫。
- 6.吸菸、慢性阻塞性肺疾病(患)，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者，請勿自行使用本藥。
- 7.不要服用超過建議劑量，因高劑量會產生焦慮、暈眩或失眠，兒童可能會產生躁動。
- 8.不要服用本藥超過七天。
- 9.服用本藥後，如果症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日，應停藥立即就醫。
- 10.服用本藥後，如果喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
- 11.本藥含抗組胺類成分，應注意下列事項：
- (1)服用本藥後，可能引起嗜睡現象，駕車或操作危險器械時要小心。不要合併飲用含酒精之飲料，亦不要服用安眠藥、鎮靜劑之類的藥品。
  - (2)除非有醫師藥師藥劑生指示，下列病患請勿服用本藥：青光眼、肺氣腫、呼吸急促、或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難等。
- 12.本藥含有支氣管擴張成分，除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病或高齡者不得服用本藥。
- 13.本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

賦形劑：Sodium Citrate, Citric Acid Anhydrous, Sodium Benzoate, Methylparaben, Sucrose, Aspartame, Allura Red AC, Brilliant Blue FCF, Grape Flavour, Water Purified

包裝：20~4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

**CENTER LABORATORIES INC.**

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-017 20150728

14S18-D01