

清立飄糖衣錠

SENNAPUR TABLETS

衛署藥製字 第 043488 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-16

版次 2

1 成分

1.1 有效成分及含量

Sennoside A+B 12.5 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Povidone K-30, Povidone K-90, Croscarmellose Sodium, Microcrystalline Cellulose, Talc, Magnesium Stearate, Sucrose, Titanium Dioxide, Polyethylene Glycol

2 用途(適應症)

緩解便秘。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 3.1.2 胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- 3.2.1 12歲以下。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- 3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 3.3.2 連續使用一星期以上。
- 3.3.3 併用其他瀉劑。

3.4 其他使用上注意事項

- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議使用量。
- 3.4.4 本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水份及運動來改善便秘。
- 3.4.5 本藥使用期間可能會有腹瀉發生。
- 3.4.6 長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。
- 3.4.7 會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。

3.4.8 刺激型瀉劑無法抑制卡路里吸收，因此不能幫助減重。此類藥品會導致水瀉、腹痛與脫水，並因脫水造成短期體重下降。嚴重脫水可能會造成顫抖、無力、視覺模糊、暈厥、腎損傷，甚至死亡，往往需要藥物治療。

3.4.9 過度使用刺激型瀉劑可能會導致電解質不平衡。體內鈉、鉀、鎂、磷為維持神經肌肉所需之特定電解質，破壞此平衡可能會造成大腸及心臟功能異常。為避免上述風險，需避免過度或不正確的使用瀉劑。

4 用法用量

成人及12歲以上	一日1次，1次1錠，於睡前(或空腹時)服用。初次應使用最小劑量，再視通便情形增減用量。
12歲以下兒童	使用前應洽醫師診治。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部分	副作用
胃腸道	噁心、嘔吐、嚴重腹痛。
其他	發疹等過敏症狀。 皮膚紅、皮膚癢等過敏症狀。

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 有任何不適情況產生。
- 5.2.2 腹瀉持續不止或更嚴重。
- 5.2.3 有血便及自發性腸道出血狀況。
- 5.2.4 使用一星期後無效。

6 包裝

2~1000錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。

7 儲存方式

儲存於25°C以下乾燥處，避免陽光直接照射。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠

歐帕生技醫藥股份有限公司	新竹縣湖口鄉光復路1號
--------------	-------------

藥商

科進製藥科技股份有限公司	台北市南港區園區街3號14樓之7
--------------	------------------

科懋生物科技股份有限公司(經銷藥
商)

台北市南港區園區街3號14樓之6