

5*11

【成分】：每毫升(ml)含有

有效成分及含量：Pseudoephedrine HCl ...6.0 mg

Tripolidine HCl.....0.25 mg

其他成分(賦形劑)：Sodium Benzoate, Aspartame, Acesulfame Potassium, Sucralose, Tartrazine, Edetate Disodium, Pineapple Flavor, Water Purified

【用途(適應症)】：緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。

【不得使用族群】：(1)曾因本藥成分引起過敏的人。

(2)服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)的人，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

(3)苯酮尿症的人，因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。

【用法用量】：一天3至4次，每次間隔4小時以上服用。

成人及12歲以上，每次10毫升；6歲以上未滿12歲，每次5毫升；6歲以下，請洽醫師診治。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

“晟德”

通鼻液

Tonbe Oral Solution

“Center”

60ml

衛署藥製字第 046676 號
G-8482

本藥品適用藥害救濟制度

LOT :

EXP :



晟德大藥廠股份有限公司
CENTER LABORATORIES INC.

新竹縣湖口鄉實踐路2號
諮詢專線：(02)2655-8680



品名：“晟德”通鼻液
諮詢專線：(02)2655-8680

“晟德”通鼻液 Tonbe Oral Solution “Center” 衛署藥製字第046676號 G-8482

【成分】：每毫升(ml)含有
有效成分及含量：

Pseudoephedrine HCl ...6.0 mg

Tripolidine HCl.....0.25 mg

其他成分(賦形劑)：Sodium Benzoate, Aspartame, Acesulfame Potassium, Sucralose, Tartrazine, Edetate Disodium, Pineapple Flavor, Water Purified

【用途(適應症)】：緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。

【使用上注意事項】：

1. 有下列情形者，請勿使用：

(1) 曾因本藥成分引起過敏的人。

(2) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)的人，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用藥品是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

(3) 苯酮尿症的人，因本藥含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑。

2. 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(1) 6歲以下。

(2) 嚴重代謝性肝腎疾病的人。

(3) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。

(4) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。

3. 有下列情形者，使用前請先諮詢

醫師藥師藥劑生：

(1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(2) 65歲以上。

(3) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

(4) 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮痛藥、鼻炎藥致抗過敏藥等的人。

4. 其他使用上注意事項：

(1) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(2) 避免陽光直射。

(3) 勿超過建議使用量。

(4) 使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

(5) 不得與酒精飲料併用。

(6) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】：

一天3至4次，每次間隔4小時以上服用。

年齡	每次用量
成人及12歲以上	10毫升
6歲以上未滿12歲	5毫升
6歲以下	請洽醫師診治

【警語】：1. 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
其他	口乾、視覺上之困擾。

2. 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(1) 若有任何不適情形產生。

(2) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】：60-4000毫升塑膠瓶裝

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存】：請密封儲存於25℃以下，不須冰存。

晟德大藥廠(股)公司(公司)
地址：臺北市南港區圓圓街
3之2號7樓
晟德大藥廠(股)公司新竹廠
(製造廠)
廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號
諮詢專線：(02)2655-8680



品名：“晟德”通鼻液
用途(適應症)：緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。
用法用量：
一天3至4次，每次間隔4小時以上服用。
成人及12歲以上每次10毫升
6歲以上未滿12歲每次5毫升
6歲以下請洽醫師診治
劑型與特徵：口服液：黃色鳳梨味
諮詢專線：(02)2655-8680