

“杏輝”

PIC/S GMP藥品

# 杏緩妥<sup>®</sup>錠 (鹽酸查諾頓) 50公絲 CIRZODONE<sup>®</sup> (Trazodone Hydrochloride) “Sinphar” Tablet 50mg

—— 憂鬱症治療劑 ——

Anti-Depressant agent

成份：每一錠含：

Trazodone Hydrochloride.....50mg

賦形劑：Silicon Dioxide Microns、Lactose SG、Microcrystalline Cellulose、Sunset Yellow Aluminum Lake、Talc、Magnesium Stearate、Calcium Carboxymethyl Cellulose。

適應症：治療各種型態之抑鬱症。

用法用量：Trazodone Hydrochloride應該於飯後或吃點心後馬上服用。

起始劑量：成人劑量為150mg/day分成數次服用，劑量每三~四天增加50mg/day。門診病患最大劑量不超過400mg/day；住院病患最大劑量不超過600mg/day。

維持劑量：依症狀使用最小有效劑量，且達到治療效果時應逐漸減少服用劑量。

使用禁忌：對Trazodone HCl過敏的病患請勿使用。

警語：1. Trazodone HCl與異常勃起的發生有關，因此若有長時間或不適當勃起時應立刻停藥並諮詢醫師。

2. 重鬱症(Major depressive disorder, MDD)和其他精神障礙之短期研究，發現小孩、青少年和年輕人服用抗憂鬱劑相較於安慰劑可能增加自殺意念及行為。任何人考慮使用(杏緩妥錠)或其他抗憂鬱劑於小孩、青少年和青年人時應評估臨床用藥之風險與效益。短期研究對於大於24歲以上之成年人服用抗憂鬱劑並無顯示有增加自殺意念或行為之風險，而對於65歲以上之老年人服用抗憂鬱劑，反而較服用安慰劑降低自殺之風險。憂鬱症或其他精神障礙疾病，本身即有自殺傾向之風險。無論任何年齡層之患者開始服用抗憂鬱劑時，健康照護者應嚴密監視其臨床病徵惡化、自殺意念或不尋常的行為改變，並隨時與醫師聯絡。

注意事項：

1. 嚴重憂鬱症的病患可能會有自殺傾向，因此處方應標明給予最少數量來符合優良病患治療(Good Patient Management)。
2. 低血壓(包括姿勢性低血壓及暈厥)曾發生過，因此伴隨降血壓藥物治療時降壓藥物的劑量必須減少。
3. 抗憂鬱症治療劑可能會影響心智或身體活動力，因此需要執行有潛在危險性工作時，如操作汽車或機械的病患需要特別注意此情形。
4. Trazodone HCl可能會增強酒精、Barbiturates、及其他中樞性抗憂鬱症治療劑的效果。
5. 懷孕危險等級C(Pregnancy Category)：給予大白鼠相當於30~50倍人類最大劑量會增加胎兒吸收副作用，Trazodone HCl用於懷孕期間需評估潛在利益及對胎兒潛在危險。

交互作用：藥物—會增加digoxin、phenytoin的血漿中濃度。

檢驗—偶有白血球、嗜中性球數目減少。

治療—避免電擊療法之併用。

貯存方式：請於室溫下存放，勿超過40℃，調劑時請存放在緊密、避光容器。

副作用：□乾、眩暈、倦睡；偶有低血壓、疲勞、頭痛、噁心；鮮少鼻塞、皮膚過敏。

包裝：6-1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第041499號  
G-5901號



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com