

帕金鎮錠

2毫克(崙和費定)

5毫克(崙和費定)

Partane

Tablets 2mg "MACRO"

Tablets 5mg "MACRO"

(Trihexyphenidyl Hydrochloride)

●成分：Each Tablet Contains：

帕金鎮錠2毫克每錠含：Trihexyphenidyl Hydrochloride.....2.0mg

帕金鎮錠5毫克每錠含：Trihexyphenidyl Hydrochloride.....5.0mg

●作用：本品為具有抗膽鹼激性和平滑肌鬆弛劑。帕金鎮錠會部分阻斷中樞膽鹼激性受體，因此幫助在基底神經節的膽鹼激性和度巴明激性的活動平衡，流涎會減少，平滑肌鬆弛。有效的減輕肌痙攣性僵直，解除帕金森氏症候群特有抑鬱狀態及精神無力症。

●適應症：帕金森氏症候群。

●用法用量：本品每天應口服三至四次，於三餐前後服之。如開始用量小，以後經四至六日或更久之時間逐漸加大劑量至有效程度者，耐藥情況則極佳。如患者已用其他藥物正作治療者，第一天服帕金鎮錠之劑量應為1毫克，間入替代原用藥物之部份治療。以後本品劑量增加，則原用藥物之劑量應同時比例減少。如帕金森氏症自始即本品治療者，第一天應服1毫克，第二天服2毫克，以後每天增2毫克，至一日之總劑量達6至10毫克止。頗多病人以此6至10毫克之每日總劑量已可收最大之效益，但部份主要屬於腦炎後帕金森氏症之患者，其平均每天所需之總劑量為12至15毫克。遵照醫師指示使用。

本藥須由醫師處方使用。

●注意事項：

1. 腦炎後帕金森氏症之患者常分泌過量之唾液，故本品宜於餐後服，於此種情況下，或需少量之阿托品作為有效之輔助治療劑。
2. 如嘴內唾液過乾者，本品可於餐前口服，唯因此而致噁心者除外；或於餐後服本品，而用薄荷糖、口香糖或大量水分等方法解渴。
3. 禁忌症：心臟缺氧者、休克者、狹角性青光眼、對本劑過敏者及嚴重的肌無力症患者。
4. 本劑與Chlorpromazine, Haloperidol, Phenothiazines併用會減低此類藥物的治療效果；會增加Digoxin之生體藥理效用；MAO抑制劑會增強本劑之作用。
5. 本品偶有不安、失眠、口乾、視力模糊、小便困難、低血壓、精神錯亂、幻覺、發疹等副作用。
6. 副作用的發生與嚴重性通常與劑量有關，可能需要減低劑量以減少副作用。

●包裝：6-1000錠罐、鋁箔盒裝。

●賦形劑：

帕金鎮錠2毫克Lactose monohydrate、Potato starch、Avicel 102、Povidone K-30、Sodium starch glycolate、Magnesium stearate。

帕金鎮錠5毫克Lactose monohydrate、Potato starch、Avicel 102、Povidone K-30、Sodium starch glycolate、Tartrazine、Sunset yellow FCF、Magnesium stearate。

●貯存：置於避光、防潮、陰涼、室溫(15-30°C)保存。

●帕金鎮錠2毫克 衛署藥製字第037712號 GMP G-4258

●帕金鎮錠5毫克 衛署藥製字第035355號 GMP G-2999

委託者：瑪科隆股份有限公司

地址：台中市西區忠明南路303號24樓之2

製造廠：羅得化學製藥股份有限公司

地址：台中市大甲區東西七路一段65號