

"杏輝"欣胃立康錠

ULWYCON TABLETS "SINPHAR"

衛署藥製字 第 034012 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

【作用】制酸及抗脹氣。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每錠含：

Aluminum hydroxide dried gel.....200mg

Magnesium hydroxide.....200mg

Simethicone.....20mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Mannitol、Potato Starch、Saccharin Sodium、Talc、Magnesium Stearate、Peppermint Oil、New Coccine、Polyvinyl Alcohol、Menthol、Water purified.

單次劑量(2錠)之酸中和能力為17.44mEq，鎂含量為10.98mEq。

2 用途(適應症)

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 消化道潰瘍的人。

3.2.3 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 與其他藥品併用時。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

3.4.5 制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。

4 用法用量

年齡	使用量
成人及12歲以上	一天3次，或需要時服用，應嚼碎後吞服，每次兩錠。
6歲以上未滿12歲	適用成人使用量之1/2(每次1錠)。
3歲以上未滿6歲	適用成人使用量之1/4(每次1/2錠)。
3歲以下	請洽醫師診治，不宜自行使用。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

12~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝、2000錠塑膠瓶裝。

7 儲存方式

25°C以下保存。

製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)