



尿路鎮痛劑
Urinary Pain Relief Agent

URTs-007
內衛藥製字第00102號

UROPRIN[®] SUGAR COATED
TABLETS 100mg

攸汝琳 路必淨[®] 糖衣錠100毫克

【成分】每錠中含：

Phenylazodiaminopyridine Hydrochloride.....100 mg

【賦形劑】

Lactose、Potato Starch、Magnesium Stearate、Hydroxypropyl Cellulose、Carmellose Calcium、Aluminum Magnesium Silicate UFL2、Hydroxypropylmethylcellulose、Talc、Dimethicone、Titanium Dioxide、Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate、Acacia、Silicon Dioxide Colloidal、Sucrose、Gelatin、Indigo Carmine、Cochineal Red A。

【適應症】

膀胱尿道炎、膀胱鏡檢查、尿道結石、尿道插入治療等疼痛之治療。

【用法・用量】

成人每次2錠，一日三次，於飯後服用，小孩劑量酌減。
如係細菌性之併發感染時，得與抗生素或磺胺劑等抗菌劑併用。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 禁忌：

- (a) 腎機能障礙患者。
- (b) 尿毒症。
- (c) 絲球體腎炎。
- (d) 妊娠時的腎盂炎。
- (e) 嚴重肝障礙患者。
- (f) 曾對本藥過敏的患者。

2. 慎重投與：對他種藥物有過敏症患者。

3. 副作用：

下述各種副作用呈現時，仔細加以觀察，若確定異常時，則中止投藥。

- (a) 肝臟：偶爾有肝障害出現。
- (b) 血液：過量投與或長期投與可能引起Methemoglobin血症，溶血性貧血。
- (c) 腎臟：過量投與或長期投與，可能引起腎障害。
- (d) 神經：偶爾頭痛、眩暈。
- (e) 消化器：食慾不振、噁心、嘔吐曾經發現過。
- (f) 過敏症：曾有發疹等過敏症報導。

4. 適用上注意事項：

- (a) 細菌感染的場合一膀胱炎尿道炎等細菌感染場合，併用化學療法劑。
- (b) 本藥內服後尿液會呈現黃褐色，係屬正常現象，故應注意衣物受污染之可能。
- (c) 有慢性絲球體腎炎、妊娠時之腎盂炎、肝炎、尿毒症等排尿障礙症狀之患者，不宜使用本藥。

【保存上之注意】

- 1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
- 2. 於25℃以下、避光儲存。
- 3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

12~1000錠塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2142120

260mm(到貨已摺6摺)x130mm
紙張：50磅道林紙

2色套色印刷

Pantone 249U 紫紅色

黑色