

# 安可治陰道栓劑

Albothyl® Vaginal Suppositories (Ovules)



(衛署藥輸字第016229號)

主成份：Policresulen

組成份：1粒陰道栓劑含量：policresulen 90mg.

賦形劑：macrogol 4000, macrogol 1500, edetic acid (policresulen 50% (weight/weight)solution in water).

適應症：子宮頸糜爛、子宮頸炎(含由毛滴蟲及念珠菌引起者)、陰道炎、白帶。

## 配合禁忌：

懷孕期，Albothyl給藥應考慮其對母親及胎兒之絕對必需性時才可給藥。

動物實驗並未有任何畸胎報告顯示。

研究至目前尚無法說明懷孕婦女的給藥的危險性，尚且不知是否主成份會排於授乳婦的乳汁內。

## 副作用：

在以Albothyl治療初期會有局部刺激作用，但通常迅速地消退。

## 藥物交互作用：

Albothyl僅能局部使用，在治療期間補不可使用其他的局部使用製劑於同樣部位。以避免藥物交互反應。

## 用法、用量：


本藥須由醫師處方使用

未經稀釋濃縮液主要用於灼療子宮頸糜爛和子宮頸內膜：每周1-2次，用時以陰道窺視器，包數鉗，棉花球等物為助。在塗擦前用少許濃縮液抹去子宮頸內膜和子宮頸頭之粘液，再用吸滿濃縮液之棉球置於患處13分鐘，然後再清除。次法可用濃縮液或1:1至1:5之稀釋液作陰道浴(Menge's Bath)，而二次灼療間以陰道栓劑或凝膠作輔助治療。止血時以浸吸藥液的棉塞壓於流血的地方12分鐘。

## 安可治陰道栓劑：

陰道栓劑用於二次灼療間，每二日使用一粒栓劑。如果栓劑由醫師塞入時，應使用棉塞加於陰道內以防止藥物之變位，棉塞於用藥12小時由患者自行取出。若栓劑由患者自己使用時，應在臨休息前插入並配帶衛生墊。

指示如何由膠膜中取出Albothyl栓劑。



## 特別注意事項：

1. Albothyl會在治療過程中產生刺激作用。如果壞死組織由病灶脫落，即使是大量時，無需驚恐。
2. 在治療期時不可用刺激性肥皂清洗或性交。
3. 與其他陰道製劑一樣，Albothyl在月經來時不可使用。
4. 應避免眼部接觸Albothyl。
5. 如有棉織物及皮革與Albothyl接觸後，必須在製劑未乾前立即洗乾淨。
6. 陰道栓劑上的斑點，是栓劑基劑產生的自然現象，不影響其使用，效果或耐受性。

## 注意：

過期的Albothyl不可使用。

Albothyl應保存於不超過25°C的室溫中。

藥物應置放於孩童拿不到之處。

## 包裝：

Albothyl栓劑：6~1000粒裝。

製造廠：Takeda GmbH

廠址：Robert-Bosch-Str.8, D-78224 Singen, Germany

藥商：瑞慶藥業有限公司

地址：台北市南京西路30號8F-3

電話：(02) 2550-1226