

size:127*255mm

抗組織胺劑
柏那[®]膜衣錠 10毫克
VENA[®] F.C.TABLETS 10mg
(內衛藥製字第05124號) ④

近來關於氣喘、蕁麻疹等所謂過敏性(Allergy)疾患之原因，被認為由組織胺(Histamine)所引起，而各國都漸傾力研究抗Histamine劑。

尤其是本劑「柏那」與Diphenhydramine(Benadryl)有同一組成，係由美國醫師會確認其效能，並收載於1944年之NNR以及1950年之美國藥局方(U.S.P)中。


日本田邊首先合成本劑，經慎重臨床試驗之結果，獲得確信，茲鄭重命名為「柏那」供應醫藥各界。

【組成】

每一錠含有Diphenhydramine Hydrochloride10mg

【有效成分的物理化學性質】

- ◎一般名：Diphenhydramine Hydrochloride
- ◎化學名：2-(Diphenylmethoxy)-N,N-dimethylethyl amine hydrochloride
- ◎構造式：



◎性狀：熔點166~170℃之白色柱狀結晶，有特異臭氣及苦味，不溶於苯、醚，但易溶於水、酒精等，對於空氣、光線比較安定。

【賦形劑】

Corn Starch、Lactose、Calcium Phosphate Dibasic、Dextrin、Magnesium Stearate、Polyvinyl Acetate、Talc、Aluminum Silicate、Silicon Resin

【適應症】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼瞢及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

【說明】

過敏成因說中極重要之組織胺說，認為由種種原因發生於體內之組織胺或類似組織胺之物質乃是過敏症狀之起因。故能從體內細胞驅逐組織胺或類似物質者當能緩解過敏性疾患。

據「柏那」施於動物實驗之結果，能證明對於組織胺具有顯著的拮抗作用，且據國內外報告綜合之亦能確認如下之效能：

- ◎蕁麻疹——不論因飲食或遭冷氣而引起之蕁麻疹，或因磺胺劑、安替比林等發生之藥物疹均能確實見效。
服用後最初有搔癢感，發疹漸消退。
本劑對於鼻炎、皮膚搔癢感、枯草熱等有效。

【用法·用量】

醫師藥師藥劑生指示藥品

成人每次3錠，一日3至4次，每次間隔4小時以上服用。

12歲以上，適用成人劑量。

6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。

3歲以上未滿6歲，適用成人劑量之1/4。

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

【注意事項】

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】

1. 服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。
2. 除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
3. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
4. 除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
5. 老年人應小心使用本藥，3歲以下不建議服用。
6. 如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
7. 服用本藥不得與酒精性飲料合用。
8. 除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮定劑或安眠劑等。
9. 服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
10. 連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應立即就醫。
11. 不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血解除成分之內服劑劑共用(如綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮痛藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等)。

【儲存條件】

本品需於室溫(15~30℃)、避光密閉容器中儲存。

【包裝】

18~1,000錠玻璃瓶裝。



製造廠：台灣田邊製藥股份有限公司新竹廠

廠址：新竹縣湖口鄉光復北路97號

藥商：台灣田邊製藥股份有限公司

地址：台北市南港區市民大道七段8號14樓之1

®: Registered Trademark of Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation