



抗原蟲製劑

FOB-005
內衛藥製字第00847號

服樂淨[®] Frotin[®]

栓劑

Suppositories



3.93cm

服樂淨栓劑係採用具有抗原蟲作用之Metronidazole為主劑而以水溶性基劑製成栓劑形式，以避免Metronidazole經口服用時可能產生輕微之消化器障害，所以堪稱為對毛滴蟲(Trichomonas)感染諸症之一良好治療劑。

【成分】每粒中含：

Metronidazole.....250mg

【賦形劑】

Benzethonium Chloride、Witepsol、Dimethylpolysiloxane、Rose V-103840、Rose #360、Sunset Yellow FCF Aluminium Lake。

【特徵】

1. 本藥對毛滴蟲作用極強，具有阻止其增殖作用，在四十萬倍之本藥水溶液於24小時內即可殺滅99%之毛滴蟲。
2. 原蟲之再現率極低。
3. 不抑制Doderlein陰桿菌之發育。

【適應症】

陰道滴蟲感染所引起之陰道炎。

【用法·用量】

成人一日一次，每次一粒塞入陰道深部（約至食指第二節處）使用之，需繼續投與10~21天，並於治療終了後最少於三個月內每1~2週或每次月經完了後必須再做毛滴蟲之檢查，如再發現必須治療至完全消失為止。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

曾對Metronidazole或其他Nitroimidazole衍生物有過敏性者。

【副作用】


1. 有時有搔癢感、腔壁充血和局部發紅等過敏症狀。
2. 治療期間有陰道處念珠菌增生現象。

【注意】


避免內服。

【剝取栓劑之方法】

①由塑膠片上撕開一個。



②由指示處撕開塑膠後取出。



【栓劑之插入法】



如上圖。用食指輕按栓劑之底部，再插入陰道內。

【保存上之注意】

1. 為保持本栓劑之品質，請放置於陰涼或避免日光直射之處。
2. 為避免小孩隨意取用，請放置於小孩不易取得之處。
3. 請在有效期限內使用。

【注意】

本栓劑之配製，旨在於體溫溶化後，即呈現效果。故保存之溫度高於體溫時，極易產生軟化、變形等現象。尤其在夏天更易產生溶化之現象，然栓劑之效果絕不致發生變化。如產生軟化，而致使用困難時，請按下列方法，俟凝固後再行使用。

1. 栓劑之形體變形時，照原塑膠包裝形態，浸入於溫水（約40~50°C）中，軟化後再按右圖，浸於冷水（20°C以下）即可凝固。
2. 栓劑如軟化或溶化時，請按右圖，浸於冷水（20°C以下）即可凝固。



【包裝】

2~100粒塑膠殼塑膠瓶裝、塑膠殼鐵罐裝、塑膠殼紙盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140918